

宮頸塗片檢查結果異常

什麼是宮頸塗片檢查?

宮頸塗片檢查是一種檢查宮頸細胞異常病變的簡捷方法。若及早發現和處理這些病變,就能夠預防多達90%的最常見類型的宮頸癌。

宮頸塗片檢查不理想指的是什麼?

宮頸塗片檢查不理想是指實驗室工作人員無法充分觀察細胞,因此無法提供報告。在這種情況下,您可能需要重做一次宮頸塗片檢查。對此無需感到恐慌。

有時候,宮頸塗片檢查會顯示發炎的體徵。如果 宮頸塗片檢查結果令人滿意,那麼您需要在兩年 後再做下一次宮頸塗片檢查。

宮頸塗片檢查結果'異常'指的是什麼?

宮頸塗片檢查結果異常是指某些宮頸細胞在某種程度上與正常細胞有所不同。在15例宮頸塗片檢查結果中,大約有1例會發生這種情況。異常結果極少意味著有宮頸癌,而且產生異常的原因有很多種。

異常病變類型

異常病變可爲低度異常病變或高度異常病變。

低度異常病變

HPV病毒很常見,在5位女性中,有4位會在她們一生中接觸到HPV病毒。大多數感染HPV病毒的女性都不會患上宮頸癌。

HPV病毒通過生殖器皮膚接觸傳播。人體通常會在1-2年內自然清除這些活性病毒。如果某類HPV病毒持續存在數年,產生宮頸癌的風險就會增加。

對低度異常病變的治療

如果您以前的宮頸塗片檢查結果正常,醫生就會要求您在一年後再來做一個宮頸塗片檢查。這就讓身體有時間清除 HPV病毒感染,並使異常病變自我消退。

如果重做的宮頸塗片檢查結果異常,醫生會推薦一位專家 爲您做陰道鏡檢查。這種檢查要求醫生使用一種稱爲陰道 鏡的儀器,放大檢視宮頸,檢查任何異常病變的程度和性 質。

有些出現低度異常病變的女性可能會直接轉診接受陰道鏡檢查,而無需重做宮頸塗片檢查。

高度異常病變

高度異常病變是指較爲嚴重的宮頸細胞病變,若不治療, 發展爲宮頸癌的可能性就更大。高度異常病變發展爲宮頸 癌通常需要多達十年的時間。

對高度異常病變的治療

如果您出現高度異常病變,全科醫師(GP)就會推薦一位 專家爲您做進一步的陰道鏡檢查。在陰道鏡檢查期間,醫 生可能會採集一小塊組織樣本(活組織檢查),並將樣本送 交實驗室檢測。

治療方法可有多種選擇,這取決於異常病變的嚴重程度。清除宮頸中的異常細胞可以採用多種方法,而且大都只需住院一天。

欲知宮頸塗片檢查結果與異常病變詳情或預訂《宮頸塗片檢查結果-宮頸塗片檢查結果異常女性指南》手冊,請致電維多利亞州癌症協會的癌症幫助熱線(Cancer Helpline),電話:131120,也可瀏覽網址:www.papscreen.org.au

欲知粵語詳情,請致電 03 9209 0161。 欲知國語詳情,請致電 03 9209 0164。

