



PapScreen
Victoria

Information

子宮頸癌預防疫苗

一些人乳頭狀瘤病毒 (HPV) 被認為與子宮頸癌有關係。目前有一種疫苗可以預防兩種導致患上大約70%子宮頸癌的人乳頭狀瘤 (HPV) 病毒。

什麼是人乳頭狀瘤病毒HPV？

HPV通過性接觸傳播，而且在有過性行為的女性中十分普遍。每五名女性就有四名會在一生中的某段時間感染HPV，並且她們大多數對此並不知情。人體自身的免疫系統通常會自然清除這些病毒。這個過程大概需要一至兩年。

但是，我們的身體很難清除某些類型的HPV (HPV16 和 18)。目前，據瞭解，長期感染這些類型的病毒會增加女性罹患子宮頸癌的風險。

什麼是子宮頸癌疫苗？

目前在澳大利亞，有一種疫苗可以預防兩種最普遍和子宮頸癌相關的HPV。這兩種病毒是HPV 16 和 HPV 18。疫苗需在六個月內連續注射三次。

誰可以接種這種疫苗？

年齡在9-26歲的女性，以及9-15歲的男性都可以接種這種疫苗。已經有很多臨床研究表明這種疫苗對女性有效。關於男性的臨床研究目前仍在進行中。

女性在沒有接觸過HPV的情況下，也就是說在有任何性行為之前，接種這種疫苗會得到最好的效果。我們建議女孩子在9-12歲之間接種。

這種疫苗可能對有過性行為的女性有效。但是由於這些女性很有可能已經接觸過疫苗所針對的一種或多種HPV，疫苗的效果可能會減弱。

我要如何接種疫苗？

澳州政府已經宣佈，從2007年4月起，這種疫苗將被列為「全國免疫計畫」National Immunisation Program 的一項。也就是說，12-18歲的女性將可以在學校免費接種，18-26歲的女性可以在她們的普通醫生 GP 那裏免費接種。

26歲以上的女性如果想接種這種疫苗就需要自付費用。疫苗的三次注射共需約\$460元。

女性仍然需要定期接受宮頸塗片檢查Pap Test嗎？

是的。所有有過性行為的女性都應該繼續接受每兩年一次的宮頸塗片檢查。這是她們預防子宮頸癌的最佳機會。就算是已經接種疫苗的年輕女性，隨著年齡增長仍然需要接受宮頸塗片檢查。這是因為這種疫苗並非對所有類型的致癌HPV都有預防作用。疫苗只能對兩種導致大約70%子宮頸癌的HPV有預防作用。因此，宮頸塗片檢查仍然十分重要。

什麼是宮頸塗片檢查？

宮頸塗片是一個檢查子宮頸細胞變化的簡捷方法。異常變化極有可能是可以自然消失的微小變化，或者是可以在惡化之前很容易被治癒的。在某些情況下，如果沒有發現並對其進行觀察，這些異常就可能發展為子宮頸癌。

對所有年齡在**18-69歲**之間有過性行為的女性來說，每兩年接受一次宮頸塗片檢查是十分重要的。

最新資料

全球

- 在女性中，子宮頸癌在最常見的癌症中列居第二；同時，據估計，由於發展中國家沒有足夠的檢測項目，每年有47萬以上的子宮頸癌新增病例，導致23.3萬人死亡。

澳大利亞

- 在2002年，共有689例子宮頸癌病例。
- 在2004年，有212名女性因罹患子宮頸癌而喪生。
- 2003年至2004年，20-69歲之間符合條件的女性中，有60.7%接受過一次宮頸塗片檢查。

維多利亞州

- 在2003年，共有176例子宮頸癌新增病例，其中48%的女性年齡在50歲以上。
- 在2003年，有52人因罹患子宮頸癌而喪生，其中75%的女性年齡在50歲以上。
- 2004年至2005年，維州20-69歲之間符合條件的女性中，有65%接受過一次宮頸塗片檢查。

想瞭解宮頸塗片檢查或子宮頸癌的女性，請致電癌症協會：**13 11 20**，或登錄 www.papscreen.org.au

想得到廣東話資訊，請致電 **9209 0161**聯絡癌症協會；想得到普通話資訊，請致電**9209 0164**。