



PapScreen
Victoria

information

Un vaccino per prevenire il cancro cervicale

Alcuni tipi di Papilloma Virus Umano o HPV sono stati associati al cancro cervicale. Attualmente è disponibile un vaccino che protegge contro due tipi di HPV che causano il 70% dei cancri cervicali.

Che cos'è il papilloma virus umano o HPV?

Il papilloma virus umano viene trasmesso per via sessuale ed è molto comune nelle donne che hanno avuto rapporti sessuali. Quattro donne su cinque avranno l'HPV in qualche punto della loro vita e molte non ne saranno mai a conoscenza. Il sistema immunitario dell'organismo generalmente si libera del virus da sé entro uno o due anni circa.

Tuttavia, l'organismo ha difficoltà a liberarsi di alcuni tipi di HPV (HPV 16 e 18). Oggi sappiamo che le infezioni a lungo termine dovute a questi tipi di virus possono aumentare il rischio di sviluppare il cancro cervicale.

Che cos'è il vaccino anti-cancro cervicale da virus?

In Australia ora è disponibile un vaccino che protegge contro due tipi di HPV che sono più comunemente associati al cancro cervicale. Questi tipi di virus si chiamano HPV 16 e 18. Il vaccino viene somministrato mediante tre iniezioni nell'arco di sei mesi.

A chi può essere somministrato il vaccino?

Il vaccino viene approvato per l'uso nei soggetti femminili di età tra i 9 e i 26 anni e nei soggetti maschili tra i 9 e i 15 anni. Sono stati condotti numerosi studi clinici che dimostrano che il vaccino si rivela efficace nei soggetti femminili. Gli studi clinici relativi ai soggetti maschili sono ancora in corso.

Il vaccino è più efficace se viene somministrato alle donne prima che siano esposte all'HPV, ossia prima che comincino ad avere rapporti sessuali. Si raccomanda che il vaccino venga somministrato alle bambine nell'età compresa tra i 9 e i 12 anni.

Le donne che hanno avuto rapporti sessuali potrebbero beneficiare del vaccino, ma in modo minore perché è possibile che esse siano già state esposte a uno o più tipi di HPV contro i quali il vaccino si rivela efficace.

Come posso ottenere il vaccino?

Il Governo Australiano ha annunciato che il vaccino verrà aggiunto al Programma Nazionale di Immunizzazione, a partire dal mese di aprile 2007. Ciò vuol dire che il vaccino sarà disponibile gratis alle ragazze dai 12 ai 18 anni di età a scuola. In aggiunta, le donne dai 18 ai 26 anni di età potranno avere accesso al vaccino gratis tramite il loro medico generico.

Le donne che hanno superato i 26 anni di età che vogliono sottoporsi alla vaccinazione dovranno pagare per il vaccino di tasca propria. Il vaccino costa circa \$460 per il ciclo delle tre iniezioni.

Le donne devono continuare a sottoporsi regolarmente al Pap test?

Sì. Tutte le donne che hanno avuto rapporti sessuali devono continuare a sottoporsi al Pap test ogni due anni. Il Pap test è il miglior mezzo di prevenzione contro il cancro cervicale. Anche le bambine che sono state vaccinate devono continuare a sottoporsi al Pap test quando diventano adulte. Questo è necessario perché il vaccino non protegge contro tutti i tipi di HPV che causano il cancro. Il vaccino è efficace contro due tipi specifici di HPV che causano fino al 70% dei cancri cervicali, ragion per cui il Pap test continua ad essere molto importante.

Che cos'è un Pap test?

Il Pap test è un test semplice e rapido che serve a controllare se si sono verificati cambiamenti nelle cellule cervicali. I cambiamenti anormali probabilmente sono cambiamenti minori che spariranno spontaneamente, o che possono essere curati con i dovuti trattamenti medici prima che diventino più gravi. Se i cambiamenti non vengono scoperti e gestiti precocemente, in certi casi le anomalie potrebbero svilupparsi in un cancro cervicale.

È importante che tutte le donne di età compresa tra i 18 e i 69 anni che hanno avuto rapporti sessuali, si sottopongano al Pap test ogni due anni.

ULTIMI DATI STATISTICI

In tutto il mondo

- Il cancro cervicale è il secondo tumore più comune nelle donne; e si ritiene che ogni anno sia causa di 470,000 nuovi casi e 233,000 morti, dovute alla mancanza di programmi di screening nei paesi in via di sviluppo.

In Australia

- Nel 2002, si sono avuti 689 casi di cancro cervicale.
- Nel 2004, 212 donne sono morte a causa del cancro cervicale.
- Nel 2003–2004, il 60.7% delle donne dai 20 ai 69 anni di età si sono sottoposte al Pap test.

In Victoria

- Nel 2003, si sono avuti 176 nuovi casi di cancro cervicale. Il 48% di questi casi si sono avuti nelle donne di oltre 50 anni di età.
- Nel 2003, 52 donne sono morte a causa del cancro cervicale. Il 75% di questi casi si sono avuti nelle donne di oltre 50 anni di età.
- Nel 2004-2005, il 65% delle donne in Victoria dai 20 ai 69 anni di età si sono sottoposte al Pap test.

Le donne che vogliono fare domande sul Pap test o sul cancro cervicale possono telefonare al Cancer Council Helpline al numero 13 11 20 o possono visitare il sito www.papscreen.org.au

Per avere informazioni in Italiano chiamare il Cancer Council al numero 9209 0163.

